



Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais
Subsecretaria de Vigilância e Proteção a Saúde
Superintendência de Vigilância Epidemiológica, Ambiental e Saúde do Trabalhador
Programa Estadual de Controle das Doenças Transmitidas pelo Aedes

Boletim epidemiológico de monitoramento dos casos de Dengue,

Febre Chikungunya e Febre Zika.

Nº 56, Semana Epidemiológica 17

Data da atualização: 25/04/2017

1- Dengue

1.1 –Distribuição dos casos

Em 2017, até o dia 25/04, foram registrados **21.280** casos prováveis de dengue (Tabela 01).

Tabela 01: Casos prováveis* de dengue por mês de início de sintomas, 2010 a 2017, MG.

Mês	Ano de início dos sintomas							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Janeiro	14.345	3.790	2.340	35.516	4.973	4.466	58.188	5633
Fevereiro	29.455	5.640	2.593	62.546	8.562	9.280	139.440	5751
Março	55.288	7.328	3.884	146.903	11.274	27.891	159.807	7418
Abril	62.396	8.637	4.748	123.962	15.315	60.045	123.101	2478
Maio	38.820	6.899	3.848	31.308	9.810	51.320	36.605	
Junho	6.399	1.686	2.524	7.231	3.496	14.218	4.780	
Julho	1.681	653	1.220	1.653	1.115	3.318	1.019	
Agosto	609	415	649	671	551	1.231	633	
Setembro	490	397	532	576	653	986	639	
Outubro	410	497	659	743	642	1.322	743	
Novembro	804	863	1.162	1.054	875	3834	1.258	
Dezembro	1.357	1.166	6.357	2.526	1.099	11.669	1.670	
Total	212.054	37.971	30.516	414.689	58.365	189.580	527.877	21.280


Fonte: SINAN-ONLINE/SES-MG - Acesso em: 25/04/2017

*Casos prováveis são os casos confirmados e suspeitos

O número de casos prováveis de dengue em 2017 acompanha o mesmo perfil de anos não epidêmicos anteriores. Nesta figura os anos epidêmicos foram excluídos para fins de comparação com objetivo de não levar a um viés de interpretação dos dados. O pico de ocorrência de casos ocorre entre as semanas epidemiológicas 14 e 17 que corresponde aos meses de março e abril (Figura 01).



Figura 01: Casos prováveis de dengue por semana epidemiológica de início de sintomas excluídos os anos epidêmicos, MG.



Fonte: SINAN-ONLINE/SES-MG - Acesso em: 25/04/2017

1.1.1 – Distribuição de casos prováveis de dengue Município

Avaliando a incidência dos casos prováveis de dengue em 2017 observa-se que 35 municípios estão com alta incidência, 97 com média incidência, 392 com baixa incidência e 329 não notificaram nenhum caso provável de dengue (Figura 02).

Nas quatro últimas semanas epidemiológicas (19/03/2017 a 15/04/2017) nove municípios se destacam por estarem com alta incidência de casos prováveis de dengue (Tabela 02); 28 municípios estão com média incidência e 294 municípios com baixa incidência (Figura 3).

Tabela 02: Municípios com alta incidência de casos prováveis de dengue nas quatro últimas semanas epidemiológicas de sintomas, MG.


URS	Município	Casos Prováveis	População*	Incidência
Diamantina	Turmalina	151	19.454	776,19
Januária	Varzelândia	151	19.702	766,42
G Valadares	Divino das Laranjeiras	34	5.082	669,03
Pedra Azul	Medina	110	21.459	512,61
Uberlândia	Araporã	33	6.657	495,72
Januária	Brasília de Minas	160	32.564	491,34
Varginha	Três Corações	350	77.921	449,17
Varginha	Luminárias	18	5.571	323,10
Montes Claros	Porteirinha	123	38.720	317,67

Fonte: SINAN-ONLINE/SES-MG - Acesso em: 25/04/2017

* População estimada 2015




Figura 02: Incidência acumulada de casos prováveis de dengue por município de residência no ano de 2017, MG.



Fonte: SINAN-ONLINE/SES-MG - Acesso em: 25/04/2017

Figura 03: Incidência de casos prováveis de dengue nas últimas quatro semanas epidemiológicas por município de residência, 2017, MG.



Legenda:

- ☐ Sem casos prováveis de dengue
- ☒ Incidência baixa – menos de 100 casos prováveis por 100.000 habitantes
- ☒ Incidência média – 100 a 299 casos prováveis por 100.000 habitantes
- ☒ Incidência alta – mais de 300 casos prováveis por 100.000 habitantes

1.2 – Distribuição dos Óbitos

Em 2016, foram confirmados 254 óbitos por dengue e 48 óbitos permanecem estão em investigação.

Em 2017 foram notificados 19 óbitos de pacientes com suspeita de dengue: 18 estão em investigação e um óbito do município de Ibirité foi confirmado como óbito por dengue.


2- Febre Chikungunya

2.1- Distribuição dos casos

Minas Gerais está em situação de alerta para chikungunya. O número de casos **aumentou 3.251%**, passando de 298 nos primeiros quatro meses do ano de 2016 para 9.986 casos no mesmo período de 2017. A curva epidemiológica de casos prováveis de chikungunya está próxima da curva epidemiológica dos casos de dengue (Figura 04).



Figura 04: Casos prováveis de dengue e chikungunya, MG, 2017.



Fonte: SES/MG/SINAN – Acesso em: 25/04/2017

Em 2017, até o momento, foram noticiados **9.986** casos prováveis de chikungunya superando os anos anteriores (Tabela 03). Em 2016, foram confirmados os primeiros casos autóctones de chikungunya. Até 2015 todos os casos notificados eram casos importados de outros estados ou de outro país.

Tabela 03: Casos prováveis de febre chikungunya, por mês de início de sintomas, 2014 – 2017, MG.

Mês	Ano de início dos sintomas			
	2014	2015	2016	2017
Janeiro	0	1	34	736
Fevereiro	0	1	78	3202
Março	0	0	89	5374
Abril	0	2	88	674
Maio	0	1	84	
Junho	0	0	22	
Julho	0	2	16	
Agosto	1	0	7	
Setembro	1	1	9	
Outubro	5	4	7	
Novembro	8	3	25	
Dezembro	3	16	44	
Total	18	31	503	9.986

Fonte: SES/MG/SINAN – Acesso em: 25/04/2017

Minas Gerais registrou em 2017, casos prováveis de chikungunya em 152 municípios: 15 estão com alta incidência, 11 com média incidência, 126 com baixa incidência e 701 estão sem casos prováveis (Figura 05).

Nas últimas quatro semanas (19/03/2017 a 15/04/2017), o estado de Minas Gerais apresentou 71 municípios com registro de casos prováveis de chikungunya. Destacam-se os oito municípios com alta incidência de casos prováveis de chikungunya (Tabela 04). O mapa apresenta os oito municípios com alta incidência, seis municípios com média incidência e 57 municípios em baixa incidência de casos prováveis (Figura 06).




Tabela 04: Municípios com alta incidência de casos prováveis de chikungunya nas quatro últimas semanas epidemiológicas, MG.

URS	Município	Casos Prováveis	População*	Incidência
G Valadares	Mathias Lobato	47	3.373	1393,42
G Valadares	Central de Minas	72	7.072	1018,10
G Valadares	Engenheiro Caldas	60	10.962	547,35
G Valadares	Governador Valadares	1.278	278.363	459,11
Pedra Azul	Medina	88	21.459	410,08
G Valadares	Tumiritinga	26	6.669	389,86
G Valadares	Jampruca	19	5.361	354,41
G Valadares	Aimorés	87	25.694	338,60

Fonte: SINAN-ONLINE/SES-MG - Acesso em: 25/04/2017


* População estimada 2015

Figura 05: Incidência de casos prováveis de chikungunya por município de residência no ano de 2017, MG.



Fonte: SINAN-ONLINE/SES-MG – Acesso em: 25/04/2017

Figura 06: Incidência de casos prováveis de chikungunya nas últimas quatro semanas epidemiológicas por município de residência, 2017, MG.



Legenda:

- Sem casos prováveis de chikungunya
- Incidência baixa – menos de 100 casos prováveis por 100.000 habitantes
- Incidência média – 100 a 299 casos prováveis por 100.000 habitantes
- Incidência alta – mais de 300 casos prováveis por 100.000 habitantes

2.2 - Distribuição dos Óbitos

Em 2017, o estado de Minas Gerais registrou 11 óbitos suspeitos por chikungunya que estão sob investigação.



3- Zika Vírus

3.1 – Distribuição dos casos

Em 2017 foram registrados 592 casos prováveis de Zika, sendo 112 em gestantes. O número de casos prováveis em 2016 foi superior ao número de casos em 2017, com maior número de casos nos meses de fevereiro e março (Tabela 05).

Tabela 05: Casos prováveis de zika vírus por mês de início de sintomas, 2016-2017, MG*.


Mês	Ano de início dos sintomas	
	2016	2017
Janeiro	742	120
Fevereiro	4.945	178
Março	4.975	259
Abril	2.214	35
Maio	833	
Junho	153	
Julho	32	
Agosto	20	
Setembro	33	
Outubro	30	
Novembro	55	
Dezembro	54	
Total	14.086	592

Fonte: SINAN/SES/MG – Acesso em: 25/04/2017

*Casos suspeitos que apresentam exantema máculopapular pruriginoso com pelo menos mais dois sintomas. Exceto os casos de recém nascido (RN) com microcefalia.

Em 2017 foram notificados casos prováveis de zika em 75 municípios. Destaca-se as regionais de saúde de Governador Valadares com três municípios com média incidência de casos (Aimorés, Tumiritinga e Resplendor) e a regional de saúde de Pedra Azul com o município de Medina também com média incidência de casos. Nenhum município encontra-se com alta incidência de prováveis, ou seja, com mais de 300 casos por 100.000 habitantes (Figura 07).

Figura 07: Incidência acumulada de casos prováveis de zika por município de residência no de 2017, MG.



Fonte: SINAN/SES-MG – Acesso em: 25/04/2017



Legenda:

- ☐ Sem casos prováveis de zika
- ☐ Incidência baixa – menos de 100 casos prováveis por 100.000 habitantes
- ☐ Incidência média – 100 a 299 casos prováveis por 100.000 habitantes
- ☐ Incidência alta – mais de 300 casos prováveis por 100.000 habitantes

4- Vigilância laboratorial

Em 2017 foram coletadas 12.348 amostras para realizar exames de diagnóstico de dengue. Os resultados de 8.600 amostras foram liberados, sendo que 1.544 (17,9%) tiveram resultado positivo ou reagente. Dos 853 municípios de Minas Gerais, 585 (68,5%) cadastraram amostras para realizar testes de dengue e 212 municípios tiveram pelo menos uma amostra positiva.

Para diagnóstico de Chikungunya foram coletadas 4.958 amostras, das quais 2.963 tiveram resultado liberado, sendo **1.634 (55,1%) reagentes ou positivas**. Dos 168 municípios que enviaram amostras para realizar teste de chikungunya, 92 tiveram pelo menos uma amostra positiva. Cinco municípios se destacam pelo alto percentual de positividade das amostras testadas: três da regional de Governador Valadares (G. Valadares, Mathias Lobato e Conselheiro Pena); dois da regional de T. Otoni (T. Otoni e Nanuque) e Medina na URS Pedra Azul.

Para diagnóstico de Zika foram testadas 688 amostras das quais 141 foram positivas. Dos 105 municípios que enviaram amostras, 45 municípios tiveram pelo menos uma amostra positiva.

4.1 – Monitoramento Viral do vírus da dengue

Até o momento, apenas seis regionais de saúde tiveram identificação do sorotipo circulante: Belo Horizonte, Januária, Montes Claros, Patos de Minas, Teófilo Otoni e Uberlândia. Três sorotipos do vírus (DENV1, DENV2 e DENV3) foram identificados (Tabela 06).

Tabela 06: Circulação viral de dengue por Unidade Regional de Saúde, 2017, MG.

Unidade Regional de Saúde	Amostras testadas para Isolamento Viral ou RT-PCR para dengue					
	Total	Positivas				
		DENV1	DENV2	DENV3	DENV4	%
Alfenas	1					0
Barbacena						0
Belo Horizonte	149	6				4,0
C. Fabriciano	21					0
Diamantina	1					0
Divinópolis	5					0
G. Valadares	27					0
Itabira	5					0
Ituiutaba	2					0
Januária	2	1				50,0
Juiz de Fora	7					0
Leopoldina						0
Manhumirim						0
Montes Claros	21			1		4,8
Passos	2					0
Patos de Minas	1	1				100,0
Pedra Azul	20					0
Pirapora						0



Ponte Nova	2					0
Pouso Alegre	5					0
São João Del Rei						0
Sete Lagoas	35					0
Teófilo Otoni	9	1				11,1
Ubá	4					0
Uberaba	4					0
Uberlândia	11		1			9,1
Unaí						0
Varginha	2					0
Total	336	9	1	1	0	3,3

Fonte: Sinan-Online - GAL/FUNED. Atualizado em: 17/04/2017

O número de vírus detectáveis não modificou, por isso esta tabela não foi atualizada esta semana.

5- Levantamento Rápido do Índice de Infestação por *Aedes aegypti* - LIRAA

LIRAA é o mapeamento rápido dos índices de infestação por *Aedes aegypti*. Permite a identificação dos criadouros predominantes e a situação de infestação do município. Índices até 1% indicam condições satisfatórias, entre 1% e 3,9%, situação de alerta e índices superiores a 4%, risco de surto.

Em outubro de 2016 o LIRAA foi realizado em 137 municípios de Minas Gerais. Sete municípios apresentaram índices de infestação predial (IIP) superiores a 3,9%, ou seja, estavam em situação de risco para ocorrência de surto (Figura 08).

Em janeiro de 2017, 29 municípios estavam em situação de risco para ocorrência de surto e 78 estão em situação de alerta (Figura 09).

Em março de 2017, o LIRAA foi realizado em 150 municípios, sendo que 58 estão com em situação de risco para ocorrência de surto, 68 em situação de alerta e 24 com baixo risco para ocorrência de surtos (Figura 10).

Figura 08: LIRAA por município, MG, out/2016




Figura 09: LIRAA por município, MG, jan/2017







Figura 10: LIRAA por município, MG, março/2017



Fonte: SES/MG. Atualizado em 10/04/2017

Legenda:

- ☐ Município que não realiza Liraa ou sem risco
- ☐ Município com baixo risco
- ☐ Município com médio risco
- ☐ Município com alto risco